



CHI PUÒ DONARE

In generale, per donare è necessario:

- avere un'età compresa tra i 18 ed i 66 anni (oltre i 60, per la prima volta, è necessario il consenso del medico curante)
- avere un peso non inferiore a 50 Kg
- non avere avuto malattie gravi
- non essere affetti da malattie croniche

CHI NON PUÒ DONARE

Esistono cause che determinano una sospensione temporanea alla donazione:

PER 48 ORE:

- Vaccinazioni anti: colera, difterite, epatite B e A, influenza, pertosse, tetano, tifo, paratifo, rabbia (a scopo profilattico,)
- Cure odontoiatriche (devitalizzazione, ablazione del tartaro)

PER 7 GIORNI:

- Dal momento della guarigione del Herpes Labiale
- Assunzione di antinfiammatori
- Interventi odontoiatrici di estrazione o di maggiore entità
- Interventi di chirurgia minore (con prognosi inferiore a 7 giorni)

PER 15 GIORNI:

- Assunzione di antibiotici, cortisonici, antistaminici
- Febbre (superiore a 38°) o influenza

PER 28 GIORNI:

- Dal rientro da zone interessate dal virus del Nilo occidentale (Stati Uniti e Sud del Canada)

PER 1 MESE:

- Vaccinazioni anti: febbre gialla, morbillo, parotite, poliomelite (vaccino orale) rosolia e tubercolosi
- Dal rientro da viaggi in Paesi con condizioni igieniche sanitarie a rischio
- Epatite alimentare
- Interventi di chirurgia minore (con prognosi uguale o superiore a 7 giorni)

PER 40 GIORNI:

- Morso di zecca

PER 3 MESI:

- Donazione di sangue intero

PER 4 MESI:

- Tatuaggio e piercing;
- Esame endoscopico con strumenti flessibili (gastrosopia, artroscopia,...)
- Somministrazione di emoderivati
- Contatto con persone affette da epatite virale
- Agopuntura (se non eseguita da professionisti qualificati)
- Interventi di chirurgia maggiore
- Trasfusione di sangue o di emocomponenti

PER 6 MESI:

- Mononucleosi, toxoplasmosi e morbo di Lyme
- Interruzione di gravidanza o aborto
- Soggiorno in zona malarica

- Soggiorno in zone endemiche per malattie tropicali (vedi elenco Paesi)

PER 12 MESI:

- Stato di gravidanza;
- Leptosirosi;
- Gravi reazioni allergiche a farmaci;

PER 3 ANNI:

- Soggiorno in zona malarica con febbri di origine non identificata al rientro

E....

Ci sono diversi fattori che determinano la **sospensione definitiva** dalla donazione di sangue:

- Soggiorno in Gran Bretagna per un periodo cumulativo superiore a sei mesi dal 1980 al 1996;
- Malattie infettive: epatite virale, sifilide, AIDS;
- Positività ai test della sifilide, dell'AIDS, dell'epatite B e/o C;
- Uso di droghe pesanti (indipendentemente dalla via di assunzione);
- Rapporti sessuali (sia etero che omo), anche protetti, con persone "a rischio";
- Trapianto di cornea;
- Malattie con danno d'organo;
- Svenimenti;